

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

adres siedziby: 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29; e-mail: spzoz@szpital.swidnica.pl

Zasady pobierania materiału oraz przygotowania się do badania mikrobiologicznego

Wszystkie badania mikrobiologiczne najkorzystniej jest wykonać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii (przed wdrożeniem antybiotyku), chyba że, lekarz zaleci inaczej.

O przydatności wyniku badania mikrobiologicznego w dużym stopniu decyduje technika pobrania materiału oraz przygotowanie pacjenta do badania.

Posiew plwociny

Plwocinę należy pobrać (odkrztusić):

- rano, na czczo,
- w przypadku posiadania protez należy je wyjąć z jamy ustnej,
- przed pobraniem próbki należy umyć zęby oraz dodatkowo przepłukać,
- jamę ustną przegotowaną wodą,
- plwocinę należy odkrztusić do sterylnego pojemnika z szerokim otworem,
- (np. sterylny pojemnik na posiew moczu).

W przypadku trudności z odkrztuszeniem plwociny należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić inhalację, fizjoterapię klatki piersiowej lub zastosowanie środków mukolitycznych.

Uwaga! Nie dotykać wewnętrznych powierzchni pojemnika oraz nakrętki.

Bezpośrednio po odkrztuszeniu plwociny pojemnik należy szczelnie zakręcić i jak najszybciej (do 3 godzin od pobrania) dostarczyć do Laboratorium Mikrobiologicznego.

Opracowanie: mgr Małgorzata Juszczyk Grudzińska wraz z zespołem